Neuropsicología del dibujo: Aves de Colombia

Patricia Montañés
Bárbara Valentina Forero

Ilustraciones
Natalia Castro Vargas

Facultad de Ciencias Humanas
Departamento de Psicología
Sede Bogotá

UNIVERSIDAD NACIONAL DE COLOMBIA



Neuropsicología del dibujo:
Aves de Colombia

Ilustraciones:
Natalia Castro Vargas

Ilustraciones a Color:
Lina Ruiz

Autores:
Patricia Montañés,
PhD. Profesora Titular. Universidad Nacional de Colombia

Bárbara Valentina Forero.
Psicóloga. Estudiante de Maestría en Neurociencias. Universidad Nacional de Colombia

Diseño:
Animal Extinto editorial

Agradecimientos:

A la Universidad Nacional de Colombia.Bajo la dirección de Patricia Montañes, este libro nace como uno de los productos asociados al trabajo de los proyectos “Neuropsicología del dibujo” y “Estudios de cognición, lengua y cultura de la comunidad indígena ika”, convocatoria nacional para el fomento de alianzas interdisciplinarias que articulen investigación, creación, extensión y formación en la Universidad Nacional de Colombia 2019-2021.

A Jesús Sanchez, quien colaboró en el desarrollo de materiales y trabajo del eje de Dibujo de Aves en el programa de estimulación cognoscitiva para pacientes con enfermedad de Alzheimer en el 2020

A Camila Gutierrez de la Asociación Bogotana de Ornitología (ABO), por sus observaciones y sugerencias.

PARA HACER EL RETRATO DE UN PÁJARO

Pintar primero una jaula
con una puerta abierta
pintar luego
algo lindo
algo simple
algo bello
algo útil
para el pájaro
poner luego la tela contra un árbol
en un jardín
en una arboleda
o en un bosque
esconderse detrás del árbol
sin decir nada
sin moverse…

A veces el pájaro llega rápido
pero también le puede llevar largos años
tomar la decisión
No desalentarse
esperar
esperar si hace falta muchos años
la rapidez o la lentitud que le tome al pájaro
llegar
no tiene ninguna relación
con el éxito del cuadro
Cuando el pájaro llegue
si llega
guardar el más profundo silencio
esperar a que el pájaro entre en la jaula
y cuando entró
cerrar suavemente la puerta con un pincel
después
borrar uno a uno todos los barrotes
teniendo cuidado de no tocar las plumas del
pájaro
Hacer luego el retrato del árbol
eligiendo la más bella de las ramas
para el pájaro
pintar también el follaje verde y la frescura del
viento
el polvo del sol
y el ruido de los insectos sobre la hierba en el
calor del verano
y después esperar que el pájaro se decida a
cantar
Si el pájaro no canta
es mal signo
signo de que el cuadro es malo
pero si canta es buen signo
signo de que puede firmar
Entonces arranque suavemente
una de las plumas del pájaro
y escriba su nombre en un rincón del cuadro.

Jacques Prévert

Traducción de Pedro Ángel Almeida
Editorial Kalandraka; N.º 1 edición (21 agosto 2020)



INTRODUCCIÓN

Colombia ocupa el primer lugar en especies de aves en el mundo. Cada año se realiza a nivel mundial el Global Bird Day, uno de los eventos internacionales más importantes dedicado a la observación de aves. La Sierra Nevada de Santa Marta es una región exuberante y biodiversa en donde se encuentra un gran número de estas aves. En el año 2019, en el sector de la cuenca del río Don Diego, en un solo día fueron avistadas más de 100 especies distintas, entre endémicas y migratorias. En medio de la naturaleza, del río y el mar, de la montaña y la selva, de los atardeceres, de los sonidos de la naturaleza, de los colores de las frutas y las flores, de los secretos de la tierra y la montaña sagrada que rodea esta tierra, cantan muchas aves todos los días.

"Neuropsicología del dibujo: Aves de Colombia", recoge algunas de estas aves con el fin de desarrollar diferentes habilidades de dibujo al tiempo que se aprenda sobre los nombres y las características generales de estos animales.

A traves de la observación de las distintas formas de patas, picos, alas, ojos, cuerpos y formas de cabeza, este libro tiene el objetivo de acompañar a niños, jovenes y adultos en el proceso de reconocimiento de diferentes aves. La descripción de las características generales, sus formas, cantos y colores, nombres y costumbres, tiene el proposito de facilitar su aprendizaje. Se proponen ejercicios de observación de las ilustraciones, de delinearlas, dibujarlas y colorearlas para darles vida.

Con este libro, el objetivo es que quienes deseen dibujar y aprender de las diferentes especies avistadas, tengan una guía para producir una copia del ave original, conservando tamaño, forma y proporción entre los elementos que componen la ilustración. Con este ejercicio, se promueve el desarrollo y refinamiento de habilidades de

observación, percepción visual, habilidades visoconstruccionales (organización espacial de los elementos, coordinación ojo-mano, planificación de la construcción de la figura y ejecución de un plan) y, de manera paralela, se promueve el aprendizaje asociativo entre elaboración de dibujos y adquisición de conocimientos específicos acerca de las aves, sus nombres y características.

Se plantea el dibujo como un medio para estimular los sentidos y procesos como la memoria, la atención, habilidades visuales y motoras. Además, dibujar las aves y aprender de ellas puede tener un efecto positivo en la cognición y la emoción.

"Neuropsicología del dibujo: Aves de Colombia", es un libro para dibujar que tiene dos versiones. La versión impresa contiene 40 ilustraciones de aves que se pueden delinear, colorear y con ayuda de una cuadridula también se pueden dibujar a escala. Contiene un índice de aves a color como referencia y cada ave está acompañada de una descripción de su nombre común y científico, así como de características generales. La versión digital, además de lo anterior, es totalmente a color y también contiene los cantos de cada ave para que puedan ser reproducidos.

A partir de una metodología de aprendizaje por asociación que se implementará como un programa piloto, se busca proponer una herramienta práctica de aprendizaje, que a la vez ayude a conocer y cuidar la biodiversidad de uno de los bellos ecosistemas de nuestro país.

El Paraíso
Ulueyi, reservas naturales del Río Don Diego
Magdalena, Colombia
Dibujo: Lina Ruiz



ÍNDICE

1. Paloma Montaraz
2. Loro real amazónico
3. Mango Gorjinegro
4. Pelicano Pardo
5. Loro cabeciazul
6. Guacamaya verde /militar
7. Gavilán pollero /Halcón de carretera
8. Jacamará cola canela
9. Tucancillo collarejo
10. Picoplano pechiamarillo
11. Vencejo acollarado
12. Ermitaño ventripálido
13. Bienteveo chico /bichofué
14. Playero manchado alzacolita
15. Titirijí común / Mosquerito Espatulilla común
16. Golondrina gorgirrufa / Barranquera
17. Cucarachero común
18. Eufonia piquigruesa
19. Zorzal Sabiá /Mirla buchiblanca
20. Pitirre americano/ Tirana dorso negro

21. Zanate caribeño
22. Cotara chiricote/ Chilacoa colinegro
23. Tángara azulada/ azulejo común
24. Espiguero pico de plata
25. Piojito pardo
26. Jacana común
27. Cenzontle tropical
28. Momoto rojizo / Barranquero
29. Chipe de agua sureño
30. Tirano melancólico
31. Martín pescador
32. Trogón enligado
33. Turpial toche
34. Cucarachero currucuchú
35. Mosquerito silbón
36. Arrendajo
37. Garrapatero mayor
38. Turpial cabecirrojo
39. Sangre de toro encendido
40. Turpial de agua

Guía para tener en cuenta:





Paloma Motarraz

Titibú -Turca - Rabiblanca

White-Tipped Dove
Leptotila verreauxi

Es un ave migratoria y una de las palomas más grandes de América, con una longitud de 29 centímetros y un peso aproximado de 155 gramos. Esta paloma generalmente se ve sola o en pareja, y es bastante cautelosa. Su vuelo es rápido y directo. Su cabeza es pequeña, color gris claro, el pico es fino y delgado, de color negro. El plumaje de pecho y vientre es de color gris claro y las alas gris oscuro. Se alimenta principalmente de semillas que obtienen en el suelo o en ramas bajas, pero también se alimentan de insectos, incluidas mariposas y polillas.

Construye un gran nido de palos en un árbol y pone dos huevos blancos. La incubación es de unos 14 días. Las crias comienzan a alimentarse por si mismas a las 4 semanas.

Paloma Motarraz

Titibú - Turca - Rabiblanca

White-Tipped Dove
Leptotila verreauxi

Paloma Motarraz

White-Tipped Dove

Leptotila verreauxi



Paloma Motarraz

White-Tipped Dove

Leptotila verreauxi

Nombre:

Fecha:

Loro real Amazónico

Yellow-crowned Parrot
Amazona ochrocephala

Es un ave nativa de Colombia. Los adultos miden aproximadamente 35 centímetros de largo, son de color verde brillante con un área amarilla en la frente y un pico de color gris. El plumaje del cuerpo es verde con un poco de coloración roja en el borde de las alas. Estas especies son juguetonas, tienden a ser ruidosas.

Se alimentan de semillas, nueces, frutas, bayas y flores, usan sus pies para manipular alimento y extraer granos de nueces con el pico.

Son aves monógamas, permanecen junto a su pareja. Sus demostraciones de cortejo incluyen inclinarse, mover las alas y la cola, levantar los pies y dilatar las pupilas

Loro real Amazónico

Yellow-crowned Parrot
Amazona ochrocephala

Loro real Amazónico

Yellow-crowned Parrot

Amazona ochrocephala



Loro real Amazónico

Yellow-crowned Parrot

Amazona ochrocephala

Nombre:

Fecha:

Colibrí Mango Gorjinegro

Black-throated Mango
Anthracothorax nigricollis

Es un ave nativa de Colombia. Mide 10,2 centímetros de largo y pesa 7,2 gramos. El pico negro alargado está ligeramente curvado, para poderse alimentar con facilidad del nectar de las flores. La cola en ambos sexos tiene plumas centrales oscuras, la cola exterior es de color rojo vino con punta oscura. Su atractivo plumaje los caracteriza. Tiene colores vivos en todo su cuerpo, que generan un efecto tornasolado. Se puede observar en campo abierto, jardines y cultivos.

El alimento de esta especie es el néctar, a menudo extraído de las flores de árboles grandes. Este colibrí también es insectívoro, a menudo revoloteando en áreas abiertas para atrapar insectos voladores.

Construye un nido de copa diminuto en una rama alta, delgada y generalmente desnuda. Los dos huevos completamente blancos son incubados por la hembra durante 16 o 17 días y el emplumado tarda otros 24 días.

Colibrí Mango Gorjinegro

Black-throated Mango
Anthracothorax nigricollis

Colibrí Mango Gorjinegro

Black-throated Mango

Anthracothorax nigricollis



Colibrí Mango Gorjinegro

Black-throated Mango

Anthracothorax nigricollis

Nombre:

Fecha:

Pelícano Pardo

Brown Pelican
Pelecanus occidentalis

Es un ave migratoria. Tiene una cabeza blanca con un lavado amarillo en la corona. Tiene un pico largo, fuerte, de color naranja. Su longitud oscila entre los 100 y 137 centímetros. El macho y la hembra son similares, pero la hembra es un poco más pequeña. La piel rosada alrededor de los ojos se vuelve opaca y gris en la temporada no reproductiva.

Se alimenta principalmente de peces, pero ocasionalmente de anfibios, crustáceos, huevos y polluelos de aves.

Anida en colonias en áreas aisladas, islas con vegetación entre dunas de arena o en matorrales. Las hembras ponen 2 o 3 huevos ovalados de color blanco. La incubación lleva de 28 a 30 días y ambos sexos comparten las tareas. De seis a nueve semanas después de la eclosión, los juveniles abandonan el nido.

Pelícano Pardo

Brown Pelican
Pelecanus occidentalis

Pelícano Pardo
Brown Pelican
Pelecanus occidentalis



Pelícano Pardo
Brown Pelican
Pelecanus occidentalis

Nombre:

Fecha:

Loro cabeciazul

Blue-headed Parrot
Pionus menstruus

Es un ave migratoria, de tamaño mediano, aproximadamente 27 centímetros de longitud. El cuerpo es mayormente verde, con cabeza y cuello azules, y un toque de rojo rosáceo en la garganta, las plumas subcaudales son rojas. Los loros de cabeza azul son pájaros ruidosos y emiten chillidos ligeros y agudos. Son populares como mascotas. Comparados con otras especies de loros (Amazonas por ejemplo) son muy tranquilos y cariñosos. Se posan en comunidad en palmeras y otros árboles, y se puede ver un gran número en los sitios de descanso al amanecer y al anochecer.

Comen frutas y semillas y, a veces, cereales.

Pone de 3 a 5 huevos blancos en la cavidad de un árbol

Loro cabeciazul

Blue-headed Parrot
Pionus menstruus

Loro Cabeciazul
Blue-headed Parrot
Pionus menstruu



Loro Cabeciazul
Blue-headed Parrot
Pionus menstruu

Nombre:

Fecha:

Guacamayo militar

Military Macaw
Ara militaris

Es un ave nativa de Colombia. Mide hasta 70 centímetros. Tiene cresta roja en la cabeza y el pico es corto y curvo. Su plumaje es principalmente de color verde vivo, con plumas azules en la parte inferior de las alas y la cola. La cola es larga y los colores pueden variar entre rojo, azul y amarillo. Pueden vivir entre 50-60 años en cautiverio y no se tiene conocimiento específico de su esperanza de vida en la selva.

Comen principalmente semillas. La variedad difiere estacionalmente según la abundancia y disponibilidad.

Las crías nacen con los ojos cerrados y desprovistas de plumaje, requieren de cuidado parental y sus tasas de crecimiento son lentas. Las parejas se forman de manera permanente y las crías permanecen con los padres por algún tiempo después de abandonar el nido.

Guacamayo militar

Military Macaw
Ara militaris

Guacamayo militar
Military Macaw
Ara militaris



Guacamayo militar
Military Macaw
Ara militaris

Nombre:

Fecha:

Gavilán pollero
Aguilucho de ala rojiza
Roadside Hawk
Rupornis magnirostris

Es un ave residente, de tamaño relativamente pequeño, mide 31 a 41 centímetros de largo y pesa de 250 a 300 gramos. Los machos son aproximadamente un 20% más pequeños que las hembras, pero por lo demás los sexos son similares. Es bastante común observar un toque rojizo en las alas del ave, especialmente cuando se ve en vuelo. Su llamada es un chillido penetrante muy agudo. Como sugiere su nombre específico (magni = grande; rostri = pico), su pico es grande. En vuelo, la cola es relativamente larga y las alas desproporcionadamente cortas del halcón de carretera son distintivas.

La dieta consiste principalmente en insectos y pequeños mamíferos, como los titíes.

Gavilán pollero
Aguilucho de ala rojiza
Roadside Hawk
Rupornis magnirostris

Gavilán pollero
Roadside Hawk
Rupornis magnirostris



Gavilán pollero
Roadside Hawk
Rupornis magnirostris

Nombre:

Fecha:

Jacamará colirrufo

Rufous-tailed Jacamar
Galbula ruficauda

Es un ave nativa de Colombia, de hasta 25 centímetros, delgada, de color verde metálico, semejante a un colibrí, Es de pico negro y largo en forma de aguja, garganta color blanca en el macho y café amarillento en la hembra, pecho verde, vientre y costados de la cola castaño rojizo. Tiene iris oscuro, patas pequeñas negruzcas y cola larga graduada. Tiene un canto muy peculiar, melodioso, como un zumbido seco. Su ambiente son los bosques húmedos, las selvas y arbustos altos y matorrales espesos en áreas humedas. Esta especie se encuentra amenazada, por la acelerada destrucción de selvas altas.

Se alimenta básicamente de insectos, principalmente mariposas, abejas, libélulas y escarabajos de brillante colorido. En su percha atrapa a los insectos y los golpea en la rama para consumir solo el cuerpo dejando caer las alas.

Anida en agujeros excavados en algún paredón de baja altura, las raíces de grandes árboles o en pequeños túneles excavados en termiteros. Pone de 2 a 4 huevos blancos. Su comportamiento es comunmente solitario.

Jacamará colirrufo

Rufous-tailed Jacamar
Galbula ruficauda

Jacamará colirrufo
Rufous-tailed Jacamar
Galbula ruficauda



Jacamará colirrufo
Rufous-tailed Jacamar
Galbula ruficauda

Nombre:

Fecha:

Tucancillo collarejo o arasarí acollarado

Collared Aracari

Pteroglossus torquatus

Nativo de Colombia, aunque migra en paises del trópico. Es un ave mediana, de 38 a 48 centímetros, con cuerpo delgado y atractivo colorido, con un peso aproximado de 242gramos. Cabeza, cuello y espalda de color negro, alas y cola negruzca, con tintes verdosos. Tienen un semicollar de color canela, el cual divide el cuello de la espalda. Las partes inferiores son amarillas, con una mancha negra en el pecho y una franja roja y negra en el vientre. Ambos sexos son similares. Es una especie amenzada. Su comportamiento es muy sociable, formando grupoas de 6 a 15 individuos, duermen en grupos o en parejas en un hueco. Este tucán se ubica en bosques primarios, áreas abiertas, pastizales, sabanas y arbustos altos en vegetación secundaria y en matorrales espesos en áreas húmedas.

Se alimenta de frutos carnosos y arilados como palmas, también consume insectos, pequeñas lagartijas y, ocasionalmente, huevos y pollos de aves pequeñas.

Anida en huecos de los árboles, a una altura de 6 a 30 metros. Ponen 3 huevos y los polluelos permanecen en el nido por espacio de 43 días.

Tucancillo collarejo o arasarí acollarado

Collared Aracari

Pteroglossus torquatus

Tucancillo collarejo
Collared Aracari
Pteroglossus torquatus



Tucancillo collarejo
Collared Aracari
Pteroglossus torquatus

Nombre:

Fecha:

Picoplano pechiamarillo
Picoancho pechiamarillo

Yellow-breasted Flycatcher
Tolmomyias flaviventris

Nativo de Colombia. Mide aproximadamente 12,7 centímetros de largo y pesa 11,3 gramos. La cabeza y las partes superiores son de color verde oliva con plumas de las alas y la cola más oscuras y con bordes amarillos. Hay dos barras laterales amarillentas. La garganta, el pecho y el anillo ocular son de color amarillo dorado, el abdomen es de color amarillo opaco. El pico está aplanado lateralmente y es negro por encima y blanco por debajo. Los sexos son similares. La llamada es un fuerte silbido. Esta especie se encuentra en los bordes de manglares.

Son aves discretas, que tienden a mantenerse en las perchas altas desde las que salen para atrapar insectos.

El nido de botella está hecho de fibra vegetal y está suspendido de una rama, generalmente cerca de un nido de avispas, lo que presumiblemente brinda cierta protección contra los depredadores. La nidada típica son 2 o 3 huevos de color blanco cremoso, que están marcados con violeta. La incubación por parte de la hembra es de 17 días hasta la eclosión.

Picoplano pechiamarillo
Picoancho pechiamarillo

Yellow-breasted Flycatcher
Tolmomyias flaviventris

Picoplano pechiamarillo
Yellow-breasted Flycatcher
Tolmomyias flaviventris



Picoplano pechiamarillo
Yellow-breasted Flycatcher
Tolmomyias flaviventris

Nombre:

Fecha:

Vencejo acollarado

White-collared Swift

Streptoprocne zonaris

Ave migratoria. Es una especie enorme y poderosa, de 20 a 22 centímetros de largo y con un peso de 90 a 125 gramos. Tiene una cola ligeramente bifurcada, que a menudo parece cuadrada. Los adultos son negros con azul brillante en la espalda y tienen un cuello blanco, más ancho y apagado en el pecho que en el trasero. Es una especie muy gregaria, con bandadas de 100 o más aves y, a menudo, en compañía de otras especies veloces. Tiene un vuelo potente, rápido y directo y asciende a grandes alturas. Alcanzan a superar velocidades de vuelo de 70 a 100 km / h a pesar de su tamaño relativamente grande.

Se alimenta en vuelo de insectos voladores, incluidos escarabajos, abejas y hormigas voladoras.

Se reproduce a principios de la temporada de lluvias. Construyen un nido de copa con barro, musgo y partes de insectos del suelo regurgitadas (la misma materia que luego se alimenta a los polluelos). Los nidos se encuentran en repisas y rincones a lo largo de las paredes de la cueva. Ponen dos huevos y la etapa de anidación termina cuando las crías se independizan de sus padres a los 45-55 días.

Vencejo acollarado

White-collared Swift

Streptoprocne zonaris

Vencejo acollarado
White-collared Swift
Streptoprocne zonaris



Vencejo acollarado
White-collared Swift
Streptoprocne zonaris

Nombre:

Fecha:

Ermitaño ventripálido
Ermitaño carinegro

Pale-bellied Hermit

Phaethornis anthophilus

Ave nativa de Colombia. Es una especie de colibrí de la familia Trochilidae. A diferencia de otras especies de colibries, su pelaje no es de colores llamativos. Tiene el característico pico largo, delgado y curvo, la cabeza pequeña, unas manchas en el area de los ojos de color café o negro que los distinguen, el vientre gris claro o blanco, dorso gris y alas negras. Solo pueden posarse en las ramas. No pueden andar o correr sobre el suelo. Sus hábitats naturales son bosques de tierras bajas húmedas tropicales o subtropicales y bosques antiguos.

Se alimentan del néctar de las flores. Aunque este es un alimento energético, es pobre en proteínas, vitaminas y minerales. Suplementan su alimentación con insectos y arañas y también los usan para alimentar a sus crías. Como van de una a otra planta, también contribuyen a polinizarlas, al igual que hacen las abejas.

Construyen sus nidos empleando telas de araña, musgo y líquenes, y los aseguran a las ramas y hojas resistentes, bastante por encima del nivel del suelo.

.

Ermitaño ventripálido
Ermitaño carinegro

Pale-bellied Hermit

Phaethornis anthophilus

Ermitaño ventripálido
Pale-bellied Hermit
Phaethornis anthophilus



Ermitaño ventripálido
Pale-bellied Hermit
Phaethornis anthophilus

Nombre:

Fecha:

Bienteveo chico
Bichofué chico

Lesser Kiskadee
Pitangus lictor

Nativo de Colombia. Mide 17 centímetros. El lomo y la cola son de color pardo rojizo. La cabeza es negra con dos franjas blancas a modo de cejas y la garganta es blanca. El pecho y abdomen son de color amarillo vivo y tiene una corona oculta del mismo color. Las alas tienen una tonalidad rojiza que contraste con todo su pleaje. El macho y la hembra son similares. Su hábitat son los matorrales húmedos tropicales en pantanos.

Su alimentación se basa en invertebrados (larvas, lombrices, insectos), también come frutas como uvas e higos.

Construyen el nido entre el macho y la hembra y este tiene un aspecto desordenado. Alcanza su madurez sexual al año de vida. Pone de 2-5 huevos por nidada. La incubación dura 13 días y los polluelos pueden separarse del nido a los 35 días de nacidos.

.

Bienteveo chico
Bichofué chico

Lesser Kiskadee
Pitangus lictor

Bienteveo chico
Lesser Kiskadee
Pitangus lictor



Bienteveo chico
Lesser Kiskadee
Pitangus lictor

Nombre:

Fecha:

Playero manchado
Andarriós maculado

Actitis macularius
Spotted Sandpiper

Es un ave migratoria, de tamaño pequeño, entre 18-20 centímetros de largo. Tiene una postura horizontal, patas cortas amarillentas, y pico naranja con un punto negro, robusto, de dos tonos. Recibe el nombre "alzacolita" por el gracioso y continuo movimiento que hace con su cola en diferentes comportamientos, sobretodo cuando busca su comida. El color de su plumaje es pardo verdoso en el dorso, con la parte inferior clara, que se vuelve muy manchada durante el verano. Las hembras tienen manchas más grandes y más negras.

Comen insectos en vuelo; crustáceos y otros invertebrados.

La hembra corteja al macho desplegando su cola y haciendo vibrar sus alas. Algunas hembras se aparean hasta con cuatro machos en una temporada y entregan muy pocos cuidados maternales. Son los machos quienes se encargan de la incubación. Los playeros manchados machos cuidan a las crías, tanto antes como después de que nazcan. Incuban sus huevos durante unos 20 a 23 días.

Playero manchado
Andarriós maculado

Actitis macularius
Spotted Sandpiper

Playero manchado
Actitis macularius
Spotted Sandpiper



Playero manchado
Actitis macularius
Spotted Sandpiper

Nombre:

Fecha:

Titirijí común
Mosquerito común

Common Tody-Flycatcher
Todirostrum cinereum

Nativo de Colombia. El Espatulilla Amarillo es un mosquerito de entre 9.5 a 10 centímetros de longitud, 6.5 g de peso con el pico de color negro, plano, largo y poco puntiagudo; patas grisáceas. La especie se distingue por presentar las partes inferiores del cuerpo de color amarillo brillante; los lados de la cabeza, el rostro y la corona son negros pero se hace más pálido, más gris, en el dorso, escapulares y rabadilla. La cola es negra, graduada con los bordes amarillo oliva y las plumas laterales de la misma presentan la punta blanca.

Captura pequeños escarabajos, moscas, avispas y otros insectos lanzándose velozmente contra el follaje.

Las parejas parecen permanecer juntas todo el año. Ambos sexos contribuyen de igual manera a la crianza, incluyendo la construcción del nido aunque el macho no participa de la incubación de los huevos. El nido es una estructura proporcionalmente grande (para el tamaño del ave) y alargada, colgante, construida con una gran variedad de material vegetal incluyendo fibras y musgos que son pegadas con telaraña y recubiertas con plumas y material vegetal. La construcción del nido puede tomar más de un mes. La nidada está usualmente compuesta de 2 a 3 huevos blancos a veces ligeramente manchados de café. El período de incubación va de 17 a 19 dias. Los polluelos permanecen en el nido entre 17-18 dias.

Titirijí común
Mosquerito común

Common Tody-Flycatcher
Todirostrum cinereum

Titirijí común
Common Tody-Flycatcher
Todirostrum cinereum



Titirijí común
Common Tody-Flycatcher
Todirostrum cinereum

Nombre:

Fecha:

Golondrina gorgirrufa

Southern Rough-winged Swallow

Stelgidopteryx ruficollis

Ave migratoria. El adulto mide 13,5 centímetros de largo y pesa 15 gramos. Es marrón en la parte superior, con alas y cola negruzcas y rabadilla gris pálida. La garganta y la parte superior del pecho son rojizas con las partes inferiores de color blanco amarillento. La cola está ligeramente bifurcada. Su vuelo usualmente es directo con aletasos lentos y deliberados. Comúnmente se le observa posada en cables o en ramas altas desnudas.

En su dieta incluye escarabajos, moscas, mosquitos y hormigas. Se alimentan solos o en grupos pequeños volando a mediana altura sobre la tierra o el agua.

El nido es construido por ambos adultos en una amplia gama de origen natural o cavidades hechas por el hombre, dentro de las cuales se incluyen agujeros de árboles y grietas de las rocas o puentes. La puesta es de 3 a 6 huevos blancos, incubados por la hembra durante 16 a 18 días y con otros 13 días para emplumar.

Golondrina gorgirrufa

Southern Rough-winged Swallow

Stelgidopteryx ruficollis

Golondrina gorgirrufa
Southern Rough-winged Swallow
Stelgidopteryx ruficollis

Golondrina gorgirrufa
Southern Rough-winged Swallow
Stelgidopteryx ruficollis

Nombre:

Fecha:

Cucarachero común
Chercán - Chivirín saltapared
Chochín casero - Curucucha

House Wren
Troglodytes aedon

Es un pájaro residente, pequeño, redondo y de cola estrecha. Mide aproximadamente 10 centímetros y pesa alrededor de 12 gramos. Tanto el macho como la hembra tienen el plumaje de las partes superiores de color pardo, con listado negro en las alas y las cola. Sus partes inferiores se hacen más claros hacia el vientre. Tiene un canto corto y repetitivo en ocasiones y, a veces, puede ser melodioso. Es un ave inquieta, de movimientos rápidos.

Se alimenta de insectos y de arácnidos que encuentra en las plantas o en el suelo.

Fabrica su nido con pastos y plumas que coloca en huecos en los árboles secos, tejados, caños, etc. El macho y la hembra se aparean y comparten las responsabilidades parentales. Anidan en las cavidades de los árboles, como los viejos agujeros de los pájaros carpinteros. La hembra pone de 4 a 8 huevos, que incuba durante unos 12 días. Los polluelos son nidicolas cuando nacen y son criados por la hembra. Ambos padres alimentan a los polluelos, que empluman después de 15 a 17 días. Alcanzan la madurez sexual al año y pueden vivir hasta 7 años.

Cucarachero común
Chercán - Chivirín saltapared
Chochín casero - Curucucha

House Wren
Troglodytes aedon

Cucarachero común
House Wren
Troglodytes aedon



Cucarachero común
House Wren
Troglodytes aedon

Nombre:

Fecha:

Eufonia piquigruesa
Calandria piquigruesa
Curruñatá piquigordo
Fruterito de pico grueso

Thick-billed Euphonia
Euphonia laniirostris

Esta ave, nativa de Colombia, es de tamaño pequeño, (12,5 centímetros de longitud). El macho tiene las partes inferiores de color amarillo intenso y las partes superiores y la cara de color azul oscuro. La hembra presenta plumaje verde oliva en las partes superiores y amarillento pálido en las inferiores. El pico es pequeño, corto y firme. Las patas son largas y delgadas.

Se alimenta principalmente de frutos pero tambien de insectos.

Construye un nido esférico. La hembra pone entre 2 a 5 huevos blancos con pintas cafes. La incubación dura 15 días.

Eufonia piquigruesa
Calandria piquigruesa
Curruñatá piquigordo
Fruterito de pico grueso

Thick-billed Euphonia
Euphonia laniirostris

Eufonia piquigruesa
Thick-billed Euphonia
Euphonia laniirostris



Eufonia piquigruesa
Thick-billed Euphonia
Euphonia laniirostris

Nombre:

Fecha:

Zorzal sabiá
Mirla buchiblanca
Zorzal de alas canelas,
Zorzal de pecho pálido
Paraulata montañera

Pale-breasted Thrush
Turdus leucomelas

El zorzal, nativo de Colombia, no presenta dimorfismo sexual aparente, aunque el macho posee las alas de mayor longitud mientras que la hembra tiene mayor peso. Su plumaje es de un color uniforme cafe claro. El ave mide aproximadamente 23 centímetros de longitud con un peso que varía entre 47–76 gramos. Es común encontrarlo en jardines con arbustos y árboles pequeños.

Se alimenta de frutos y pequeños invertebrados como lombrices, grillos y escarabajos.

Zorzal sabiá
Mirla buchiblanca
Zorzal de alas canelas,
Zorzal de pecho pálido
Paraulata montañera

Pale-breasted Thrush
Turdus leucomelas

Zorzal sabiá
Pale-breasted Thrush
Turdus leucomelasa



Zorzal sabiá
Pale-breasted Thrush
Turdus leucomelasa

Nombre:

Fecha:

Pitirre americano
Sirirí migrante
Tirano viajero - Tirano oriental

Eastern Kingbird
Tyrannus tyrannus

Son aves que migran en bandadas. Los adultos son de color gris a negruzco en el dorso, mientras el vientre y el pecho son blancos. Tienen una larga cola negra con el extremo blanco y alas largas y puntiagudas. Tienen una mancha roja en su corona, pocas veces observada. Alcanzan entre 19 y 23 centímetros de longitud , 33 a 38 centímetros de envergadura de las alas y un peso de entre 33 y 55 gramos. Son aves agresivas cuando defienden su territorio, incluso en contra de ves mucho más grandes.

En sitios abiertos capturan insectos en vuelo, a veces descendiendo a recoger comida de la vegetación.

Su hábitat de crianza son las zonas abiertas de América del Norte. Hacen un nido resistente en forma de taza en un árbol o arbusto, a veces en la parte superior de un tronco. Tanto el macho como la hembra participan en la defensa del nido, pero las hembras pueden permanecer en los nidos bien ocultas. Ponen generalmente 3 huevos de color crema con manchas rojizas. La incubación es de 14 a 17 días y las crías empluman de 16 a 17 días después de la eclosión y alcanzan la madurez sexual al año.

Pitirre americano
Sirirí migrante
Tirano viajero - Tirano oriental

Eastern Kingbird
Tyrannus tyrannus

Pitirre americano
Eastern Kingbird
Tyrannus tyrannus



Pitirre americano
Eastern Kingbird
Tyrannus tyrannus

Nombre:

Fecha:

Maria Mulata
Zanate mexicano o clarinero

Great-tailed Grackle
Quiscalus mexicanus

Es nativo de Colombia. Los machos adultos de zanate caribeño miden unos 27 centímetros de largo y tienen una cola larga en forma de cuña. El plumaje del macho es totalmente negro con irisaciones violetas, tiene los ojos amarillos y un pico oscuro y fuerte. Las hembras adultas miden unos 23 centímetros, tienen la cola más corta y el plumaje pardo grisáceo, más oscuro en las partes superiores. Los machos juveniles tienen la cola más corta que los adultos y tienen parte del plumaje parduzco, en cambio las hembras jóvenes son muy parecidas a las adultas. Suele atacar en grupos a sus posibles depredadores, como a los perros, mapaches o humanos. Por la noche descansan en grupo.

Se suele alimentar en el suelo, de insectos, otros invertebrados o desperdicios. Puede resultar muy atrevido y audaz, y llega a entrar en las casas y restaurantes en busca de comida.

Cría en colonias construyendo nidos en forma de cuenco bastante profundos que construyen en los árboles. Suelen poner de dos a cuatro huevos blanquecinos que incuban durante 12 días. Los pollos tardan en dejar el nido otros 12 días.

Maria Mulata
Zanate mexicano o clarinero

Great-tailed Grackle
Quiscalus mexicanus

Maria Mulata
Great-tailed Grackle
Quiscalus mexicanus



Maria Mulata
Great-tailed Grackle
Quiscalus mexicanus

Nombre:

Fecha:

Cotara chiricote
Cotara caracolera
Chilacoa- Colinegra o Chiricoca

Gray-cowled Wood-Rail
Aramides cajaneus

Es un ave nativa de Colombia. La cotara chiricote presenta cabeza y cuello gris azulado. Su pecho es castaño rojizo, la base del pico es amarillenta y la punta verdosa. Sus iris son rojos y sus patas rosadas. Mide entre 36 y 38 centímetros. Generalmente es furtiva, suspicaz y dificil de ver. Ocasionalmente camina en terreno abierto. Se puede ver sola, en pareja o en pequeños grupos, pero en la estacion seca de los Llanos, se puede ver en números mayores cerca de las charcas. Es parcialmente nocturna y reposa sobre alguna percha elevada

Se alimenta de los cangrejos de los manglares.

Pone de 3-7 huevos color crema pálido, punteados y manchados de café. El nido tiene forma de taza profunda. Anida a una altura entre 1 y 7m en enrredaderas o arbustos.

Cotara chiricote
Cotara caracolera
Chilacoa- Colinegra o Chiricoca

Gray-cowled Wood-Rail
Aramides cajaneus

Cotara chiricote
Gray-cowled Wood-Rail
Aramides cajaneus



Cotara chiricote
Gray-cowled Wood-Rail
Aramides cajaneus

Nombre:

Fecha:

Tángara azulada
Azulejo de jardín
Viudita

Blue-gray Tanager
Thraupis episcopus

La tángara azul es nativa de Colombia. Mide 18 centímetros de longitud y pesa 35 gramos. Los adultos tienen la cabeza y las partes inferiores del cuerpo color gris azulado claro, las partes dorsales son azules oscuras, con verde azul brillante en las alas y la cola, y los hombros con diferentes matices de azul. El pico es corto y grueso. Los dos sexos son similares.

Se alimenta principalmente de frutos, pero también de néctar e insectos. Se acerca a zonas habitadas por humanos, por lo cual también se alimenta de algunos frutos cultivados.

La hembra pone de uno a tres huevos que varían entre blanquecinos y grises, con manchas oscuras, en un nido en forma de cuenco profundo. Este se construye en la coyuntura de las ramas de árboles altos, o bien en huecos en edificios. La hembra incuba los huevos durante 14 días, y cría a los polluelos por otros 17.

Tángara azulada
Azulejo de jardín
Viudita

Blue-gray Tanager
Thraupis episcopus

Tángara azulada
Blue-gray Tanager
Thraupis episcopus



Tángara azulada
Blue-gray Tanager
Thraupis episcopus

Nombre:

Fecha:

Espiguero pico de plata
Espiguero gris
Semillero intermedio

Gray Seedeater
Sporophila intermedia

Es nativo de Colombia. Mide 11 centímetros y pesa de 11 a 16 gramos. Presenta pico robusto. El macho tiene la cabeza, el cuello y todas las partes altas de color gris azuloso. El iris de sus ojos es café, su pico naranja rosáceo y patas negruzcas. La hembra es de color café en la coronilla, nuca, baja espalda y cola. Su rostro es un poco más pálido y su garganta y pecho son de color café claro el cual se extiende por los flancos.

Se alimenta de semillas de pastos, también incluye néctar y pequeños artrópodos en su dieta, especialmente en le época seca. En ocasiones efectúa salidas aéreas para capturar insectos al vuelo.

Construye un nido en forma de copa con raíces, fibras y recubierta con fibras más finas a una altura que puede oscilar entre 2 y 6 m sobre la ramificación de una rama en un árbol pequeño. El tamaño de su postura es 2-3 huevos de color crema con manchas cafés oscuras. Permanece en parejas o grupos pequeños fuera de temporada reproductiva, en ocasiones con otros espigueros o semilleros.

Espiguero pico de plata
Espiguero gris
Semillero intermedio

Gray Seedeater
Sporophila intermedia

Espiguero pico de plata
Gray Seedeater
Sporophila intermedia



Espiguero pico de plata
Gray Seedeater
Sporophila intermedia

Nombre:

Fecha:

Piojito pardo
Tiranuelo murino
Mosquerito cafecito
Atrapamoscas color ratón

Mouse-colored Tyrannulet
Phaeomyias murina

Su pecho es de color grisáceo verdoso y su vientre es de tonos amarillentos claros. Su pico es oscuro, recto y puntiagudo. Frecuenta los estratos medio y superior en bosque. Es difícil detectar visualmente a esta especie, principalmente por sus hábitos y coloración.

Se alimenta de insectos, pero también consigue frutas, principalmente bayas de muerdagos

Se la observa generalmente solo o de a dos.

Piojito pardo
Tiranuelo murino
Mosquerito cafecito
Atrapamoscas color ratón

Mouse-colored Tyrannulet
Phaeomyias murina

Piojito pardo
Mouse-colored Tyrannulet
Phaeomyias murina



Piojito pardo
Mouse-colored Tyrannulet
Phaeomyias murina

Nombre:

Fecha:

Jacana común
Gallareta
Jacana suramericana

Wattled Jacana
Jacana jacana

Es nativa de Colombia. Presenta la cabeza, el cuello, la primera parte del dorso y la región ventral de color negro; el resto del dorso es color castaño vivo. El pico es amarillo y presenta un gran escudo frontal de color rojo. Las patas son largas y los dedos extraordinariamente largos, lo que le permite caminar sobre la vegetación flotante y los humedales. La corta cola es castaña con la punta negra. Las alas presentan un espolón en la articulación. Alcanza los 27 centímetros de longitud. La hembra es más grande que el macho.

Se alimenta de insectos y animales pequeños.

La hembra deposita los huevos sobre la vegetación flotante sobre un nido que ha construido el macho, que también se encarga de la incubación y del cuidado de los pollos.

Jacana común
Gallareta
Jacana suramericana

Wattled Jacana
Jacana jacana

Jacana común
Wattled Jacana
Jacana jacana



Jacana común
Wattled Jacana
Jacana jacana

Nombre:

Fecha:

Cenzontle tropical
Sinsonte tropical
Paraulata llanera

Tropical Mockingbird
Mimus gilvus

Es nativo de Colombia. Los adultos miden 25 centímetros y pesan 54 gramos. Su cabeza y partes superiores son de color gris. Tienen ojos amarillos, un parche de ojo blanco y rayas oscuras a través del ojo. Las partes inferiores son de color blanquecino y las alas son negruzcas, con dos franjas blancas en las alas y bordes blancos en las plumas de vuelo. Tienen una larga cola oscura, con las puntas de las plumas blancas, un delgado pico negro con curvatura ligeramente hacia abajo y largas patas oscuras. Macho y hembra son similares.

Es común en la mayoría de los hábitats abiertos, entre ellos asentamientos humanos.

Se alimentan principalmente de insectos y algunas bayas. Estas aves se animan a tomar comida de platos o mesas. Mientras se alimentan, con frecuencia extienden sus alas en un movimiento peculiar de dos etapas: mostrando la parte blanca de las alas y luego volviendo a plegarlas.

La incubación, llevada a cabo solo por la hembra, dura de 13 a 15 días, con un poco más para abandonar el nido. Esta ave defiende su nido agresivamente contra otras aves y animales, incluyendo grandes iguanas, perros y mangostas.

Cenzontle tropical
Sinsonte tropical
Paraulata llanera

Tropical Mockingbird
Mimus gilvus

Cenzontle tropical
Tropical Mockingbird
Mimus gilvus



Cenzontle tropical
Tropical Mockingbird
Mimus gilvus

Nombre:

Fecha:

Barranquero
Barranquillo ventrirrufo
Momoto rojizo- Momoto gritón

Whooping Motmot
Momotus subrufescens

Nativo de Colombia. Habita en ambientes boscosos húmedos o en plantaciones de café y platanos. Es un ave grande, puede medir entre 30 y 48 centímetros de longitud. Cuenta con una cola larga y elegante, con dos adornos al final. Balancea la cola similar al péndulo de un reloj. Pesa 1kg aproximadamente. Tiene una cabeza grande, pico grueso y alrededor de los ojos una especie de antifaz negro. Su plumaje es de colores verdes y azules vivos, junto con plumas negras que generan un efecto tornasolado. El cuerpo es ancho y se une a la cabeza de forma que pareciera que no tuviera cuello.

Se alimentan de insectos grandes, vertebrados pequeños y frutas. Para cazar a sus presas se lanzan sobre ellas como si estuvieran haciendo un clavado, por lo cual a la mayoria de insectos los atrapan en pleno vuelo. De esta manera, tiene un papel regulador de plagas.

En el proceso de cortejo el macho le lleva a la hembra un regalo, puede ser un fruta o una rama. Si la hembra acepta el regalo, se vuelven pareja. Son aves monogamas. Se puede tornar agresivo en la temporada de construcción de nidos. Generalmente la hembra coloca 4 huevos por nidada, la responsabilidad de empollar es de los dos sexos, se van turnando y el periodo de incubación puede durar entre 15 y 19 días.

Barranquero
Barranquillo ventrirrufo
Momoto rojizo- Momoto gritón

Whooping Motmot
Momotus subrufescens

Barranquero
Whooping Motmot
Momotus subrufescens



Barranquero
Whooping Motmot
Momotus subrufescens

Nombre:

Fecha:

Chipe de agua sureño
Reinita de Luisiana

Lousiana Waterhrush
Parkesia motacilla

Es un ave migratoria que en invierno pasa por Colombia. Mide entre 14 y 17 centímetros y puede pesar entre 16 y 20 gramos. La cabeza es color café con una especie de ceja blanca o amarilla. El pico es oscuro, pequeño y en punta. La garganta y el pecho tienen pintas negras y el plumaje es amarillo. Ambos sexos son similares.

Se alimenta principalmente de insectos acuáticos que encuentra en el suelo a lo largo de arroyos o en agua estancada, también come pequeños moluscos que busca entre la hojarasca del suelo.

La hembra pone usualmente 5 huevos, la incubación dura de 14 a 16 días. Ambos padres se encargan de cuidar a sus crias. Estas, a su vez, pueden volar a los 6 días, dejan el nido y se alimentan por si mismas.

Chipe de agua sureño
Reinita de Luisiana

Lousiana Waterhrush
Parkesia motacilla

Chipe de agua sureño
Lousiana Waterhrush
Parkesia motacill



Chipe de agua sureño
Lousiana Waterhrush
Parkesia motacill

Nombre:

Fecha:

Tirano melancólico
Sirirí común

Tropical Kingbird
Tyrannus melancholicus

Es un ave nativa de Colombia. Mide aproximadamente 20 centímetros y pesa 40-45 gramos. Ambos sexos son de apariencia similar. El plumaje en pecho y abdomen es de color amarillo, el cuello es gris claro y la cabeza gris, el dorso se ve entre gris y verde oliva. Es un ave que destaca por su comportamiento agresivo hacia otras aves, incluso aves que pueden duplicar su tamaño. En Colombia se destaca la expresión "¡qué sirirí!" refiriendose a una persona cansona, ruidosa o molesta.

Se alimenta de insectos y usualmente los caza en pleno vuelo, también puede suplementar su dieta con frutas.

La hembra coloca tres huevos de color gris con manchas rojizas o cafes, los polluelos nacen aproximadamente 15 días después y abandonan el nido poco tiempo después de nacer. El nido es en forma de taza y lo construyen con pasto, raices y ramitas.

Tirano melancólico
Sirirí común

Tropical Kingbird
Tyrannus melancholicus

Tirano melancólico
Tropical Kingbird
Tyrannus melancholicus



Tirano melancólico
Tropical Kingbird
Tyrannus melancholicus

Nombre:

Fecha:

Martín gigante neotropical
Martín pescador de collar

Ringed Kingfisher
Megaceryle torquata

Es un ave nativa de Colombia. Mide entre 36 y 41 centímetros. Su pico es largo, negro y grueso. Se caracteriza por la presencia de un copete marcado. Tanto la cabeza como el dorso son de color gris azulado. Los dos sexos tienen apariencia similiar. En el cuello tienen una especie de collar blanco. Ell pecho es de color griz azulado y el vientre color café rojizo.

Captura peces, usualmente se ubica en ramas bajas y cercanas al agua y desde ellas se zambulle. También come insectos, anfibios y reptiles. Golpea la presa contra la superficie donde se posa y luego se la come.

Construye su nido dentro de la tierra, a 2 metros de profundidad. En este, la hembra pone 3-5 huevos blancos. Los polluelos abandonan el nido 35 días después de nacer.

Martín gigante neotropical
Martín pescador de collar

Ringed Kingfisher
Megaceryle torquata

Martín gigante neotropical
Tropical Kingbird
Tyrannus melancholicus



Martín gigante neotropical
Tropical Kingbird
Tyrannus melancholicus

Nombre:

Fecha:

Trogón enligado

Gartered Trogon
Trogon caligatus

Es un ave residente. Habita bosques tropicales y plantaciones de cacao. Es una especie de tamaño mediano, mide 23 centímetros aproximadamente. Su cabeza es negra, el pico es corto, grueso y gris. Aunque toda la cabeza es negra, la zona de los ojos esta rodeada de color amarillo. A medida que desciende el plumaje del cuello al pecho, el color de este cambia, pasando por negro, azul oscuro y azul claro. El viente es amarillo. La cola es larga y blanca, con lineas horizontales negras.

Cazan insectos como larvas de mariposas y suplementan su alimentación con frutos y semillas. También se ubican cerca de avisperos y atrapan las avispas en pleno vuelo.

Son especies solitarias, pero cuando forman pareja permanecen juntos de por vida. Las hembras ponen 2 o 3 huevos de color blanco. Los nidos los ubican en avisperos o en hormigueros viejos vacios.

Trogón enligado

Gartered Trogon
Trogon caligatus

Trogón enligado
Gartered Trogon
Trogon caligatus



Trogón enligado
Gartered Trogon
Trogon caligatus

Nombre:

Fecha:

Turpial toche
Turpial montañero
Bolsero dorso dorado

Yellow-backed Oriole
Icterus chrysater

Es un ave nativa de Colombia.Su territorio natural es bosque y sabana. Se pueden encontrar en plantaciones de café. Mide entre 20 y 24 centímetros y su peso oscila entre 48 y 21 g, siendo los machos más grandes. Tiene un atractivo plumaje colorido, la cabeza es negra junto con las alas y la cola. El pico es puntiagudo, delgado y corto. El dorso, pecho y vientre son de color amarillo quemado, o dorado, que resalta en la distancia. Su canto es muy melodioso.

Se alimenta de insectos, artropodos, frutas silvestres y el nectar de las flores, para alimentarse van saltando entre las ramas.

Es una especie monógama, anidante solitario. Construye el nido con hierbas secas y ramas fuertes a alturas de minimo 7 metros. Las hembras ponen de 2-3 huevos blancos con manchas purpuras.

Turpial toche
Turpial montañero
Bolsero dorso dorado

Yellow-backed Oriole
Icterus chrysater

Turpial toche
Yellow-backed Oriole
Icterus chrysater

Turpial toche
Yellow-backed Oriole
Icterus chrysater

Nombre:

Fecha:

Chupahuevos
Cucarachero
Currucuchú
Chuchafría

Bicolored Wren
Campylorhynchus griseus

Es un ave nativa de Colombia y Venezuela. Su plumaje se caracteriza por ser de color marrón, o rojizo, en la parte superior de su cuerpo, mientras que las plumas de su pecho y vientre son de color blanco. Tiene una cola larga, también de color marrón, con algunos puntos blancos, lo cual es algo muy particular de su especie. Sus patas son delgadas, de color oscuro y alargadas, permitiendo agarrarse firmemente de las ramas de los arbustos, mientras que sus alas son pequeñas y ajustadas al tamaño de su cuerpo. Tiene un pico puntiagudo que le sirve para atrapar insectos.

Usualmente explora las hojas de los arboles en busca de insectos, siendo apodada “chupa huevos” debido a su preferencia por alimentarse de ellos.

Estos animales suelen ocupar los nidos abandonados de otras aves para allí cuidar a sus polluelos, poniendo de tres a cinco huevos de color canela con puntos oscuros.

Chupahuevos
Cucarachero
Currucuchú
Chuchafría

Bicolored Wren
Campylorhynchus griseus

Chupahuevos
Bicolored Wren
Campylorhynchus griseus



Chupahuevos
Bicolored Wren
Campylorhynchus griseus

Nombre:

Fecha:

Mosquerito silbón
Piojito silbón
Tiranuelo Silbador
Atrapamoscas lampiño

Southern Beardless-Tyrannulet (Northern)
Camptostoma obsoletum

Nativa de Sudamérica. Se distingue de otros pájaros por su “cresta” despeinada. Tanto su pico como sus ojos son pequeños y de tonalidad oscura, contrastando con el color marrón grisáceo de las plumas de las alas. La cola de estas aves es corta, teniendo el mismo tono que sus alas, aunque con bordes de color blanco. Sus delgadas y pequeñas patas le permiten aferrarse a ramitas o tallos, en donde es común escucharlos cantar.

Se alimenta de insectos y pequeños invertebrados que habitan en los arboles o arbustos, junto a diversos frutos que se encuentran en las bayas.

Usan materiales vegetales para construir sus nidos, los cuales suelen tener una entrada lateral a una altura de al menos 20 centímetros del suelo. Una vez se ha elaborado el nido, la hembra pone dos huevos blancos con pigmentos de color café.

Mosquerito silbón
Piojito silbón
Tiranuelo Silbador
Atrapamoscas lampiño

Southern Beardless-Tyrannulet (Northern)
Camptostoma obsoletum

Mosquerito silbón
Southern Beardless-Tyrannulet (Northern)
Camptostoma obsoletum

Mosquerito silbón
Southern Beardless-Tyrannulet (Northern)
Camptostoma obsoletum

Nombre:

Fecha:

Cacique lomiamarillo
Arrendajo

Yellow-rumped Cacique
Cacicus cela

Es un ave nativa de Colombia. Tiene un pico puntiagudo de color blanco cremoso, el cual contrasta con sus plumas que mayormente son de color negro brillante. Por otra parte, estas aves tienen alas grandes que se caracterizan por tener un parche de plumas de color amarillo; además, su cola es alargada, con una mancha amarilla en la parte inferior. Sus patas oscuras son fuertes y poseen garras de gran tamaño, las cuales le permiten sostenerse en las ramas más grandes de los árboles.

Se alimentan principalmente de semillas y de insectos que encuentran debajo de las hojas

Suelen habitar en colonias constituidas por nidos elaborados a partir de material vegetal. Los machos más jóvenes luchan con otros para asegurar su dominancia sobre las hembras durante la época de cría.

Cacique lomiamarillo
Arrendajo

Yellow-rumped Cacique
Cacicus cela

Cacique lomiamarillo
Yellow-rumped Cacique
Cacicus cela



Cacique lomiamarillo
Yellow-rumped Cacique
Cacicus cela

Nombre:

Fecha:

Garrapatero mayor

Greater Ani
Crotophaga major

Nativa de Colombia. Su plumaje es completamente negro, ante la luz pareciera tener brillo de color azul, mientras que sus ojos son prominentemente blancos. Tiene un gran pico oscuro, que llega a comprimirse en la parte superior. Su cola es larga, siendo casi del mismo tamaño de su cuerpo, con un lustre verdoso en sus plumas. Pese a que tiene unas patas cortas, sus garras son lo suficientemente fuertes para aferrarse en ramas grandes.

Se alimenta especialmente de insectos grandes, aunque su dieta también incluye lagartos y ranas.

Cada hembra pone entre 2 y 7 huevos, siendo estos criados en nidos con formas de taza revestidos con hojas y ramas

Garrapatero mayor

Greater Ani
Crotophaga major

Garrapatero mayor
Greater Ani
Crotophaga major



Garrapatero mayor
Greater Ani
Crotophaga major

Nombre:

Fecha:

Turpial cabecirrojo
Toche roblero - Bolsero coroninaranja
Gonzalito real
Turpial coroninaranja

Orange-crowned Oriole
Icterus auricapillus

En un ave nativa de Colombia. Se caracteriza por las plumas de color naranja que se encuentran a los lados de la cabeza y en la coronilla. Sus alas se acomodan al tamaño de su cuerpo y su cola sobresale por ser delgada y larga. Tiene un pico afilado de color negro, de la misma tonalidad que las plumas de su frente, mentón y pecho. Tiene unas patas cortas y esbeltas que son de color negro.

Comúnmente se alimenta de diferentes tipos de insectos y artrópodos, aunque también se le puede observar consumiendo frutos y néctar.

Los nidos que construyen parecen bolsas alargadas, las cuales típicamente se cuelgan de las frondas de las palmas y alli las hembras suelen depositar al menos dos huevos.

Turpial cabecirrojo
Toche roblero - Bolsero coroninaranja
Gonzalito real
Turpial coroninaranja

Orange-crowned Oriole
Icterus auricapillus

Turpial cabecirrojo
Orange-crowned Oriole
Icterus auricapillus



Turpial cabecirrojo
Orange-crowned Oriole
Icterus auricapillus

Nombre:

Fecha:

Sangre de toro encendido
Asoma terciopelo
Tángara dorsirroja
Toche pico de plata

Crimson-backed Tanager
Ramphocelus dimidiatus

Ave nativa de Colombia. El pico del macho es de color blanco o plateado brillante, teniendo, a su vez, una mandíbula gruesa. La mayor parte de su plumaje es de color rojo aterciopelado, siendo mas oscuro en la cabeza y mas claro en los flancos y la rabadilla. Tanto sus alas como las plumas de su cola son pequeñas y de color negro. Tiene patas cortas con dedos finos de los que sobresalen unas garras alargadas.

Su principal alimento son las frutas, como el banano, aunque su dieta también incluye lagartijas e insectos.

La hembra en etapa reproductiva pone dos huevos al año, caracterizados por ser de color azul con algunos puntos oscuros.

Sangre de toro encendido
Asoma terciopelo
Tángara dorsirroja
Toche pico de plata

Crimson-backed Tanager
Ramphocelus dimidiatus

Sangre de toro encendido
Crimson-backed Tanager
Ramphocelus dimidiatus



Sangre de toro encendido
Crimson-backed Tanager
Ramphocelus dimidiatus

Nombre:

Fecha:

Turpial de agua
Varillero capuchino
Monjita cabiciamarilla
Toche de pantano

Yellow-hooded Blackbird
Chrysomus icterocephalus

Ave nativa de Colombia. El pico del macho es de color blanco o plateado brillante, teniendo, a su vez, una mandíbula gruesa. La mayor parte de su plumaje es de color amarillo, siendo mas oscuro en la cabeza y mas claro en los flancos y la rabadilla. Tanto sus alas como las plumas de su cola son pequeñas y de color negro. Tiene patas cortas con dedos finos de los que sobresalen unas garras alargadas.

Su principal alimento son las frutas, como el banano, aunque su dieta también incluye lagartijas e insectos.

La hembra en etapa reproductiva pone dos huevos al año, caracterizados por ser de color azul con algunos puntos oscuros.

Turpial de agua
Varillero capuchino
Monjita cabiciamarilla
Toche de pantano

Yellow-hooded Blackbird
Chrysomus icterocephalus

Turpial de agua
Yellow-hooded Blackbird
Chrysomus icterocephalu



Turpial de agua
Yellow-hooded Blackbird
Chrysomus icterocephalu

Nombre:

Fecha:

FORMA DE LA CABEZA



OJOS



PICOS



PATAS



CUERPO



COLA



ALAS



FUENTES CONSULTADAS

Fuentes del texto

1. Naturalista Colombia https://colombia.inaturalist.org
2. Naturalista Mexico https://www.naturalista.mx
3. Wiki aves de Colombia https://www.icesi.edu.co/wiki_aves_colombia/tiki-index.php?page=Introduccion
4. Animal Diversity Web https://animaldiversity.org
5. NatureServe Explorer https://explorer.natureserve.org
6. Laboratorio de ornitología de Cornell https://www.birds.cornell.edu/home/
7. Blog de aves https://hablemosdeaves.com
8. Hilty, S. L., y Brown, W. L. (2001). Guía de las Aves de Colombia. American Bird Conservancy, Imprelibros SA.
9. McMullan,M. (2018). Field Guide. Birds of Colombia. Bogotá. Rey Naranjo editores.
10. Ayerbe, F.(2018). Avifauna colombiana. Bogotá. Punto aparte editores.

Fuentes de audio:

Paloma Montaraz: Yair Guillermo Molina Martínez., XC386638. Accesible en www.xeno-canto.org/386638
Loro real amazónico: Jerome Fischer, XC537087.
Accesible en www.xeno-canto.org/537087
Mango Gorjinegro : Luiz C. Silva, XC170424. Accesible en www.xeno-canto.org/170424
Pelicano Pardo: Isain Contreras Rodríguez, XC540652. Accesible en www.xeno-canto.org/540652
Loro cabeciazul: Jayrson Araujo de Oliveira, XC493844. Accesible en www.xeno-canto.org/493844.
Guacamaya verde /militar : Jacob Wijpkema, XC391487. Accesible en www.xeno-canto.org/391487
Gavilán pollero /Halcón de carretera: Niels Krabbe, XC251467. Accesible en www.xeno-canto.org/251467
Jacamará cola canela: Jerome Fischer, XC561654. Accesible en www.xeno-canto.org/561654
Tucancillo collarejo: Johan Chaves, XC439335. Accesible en www.xeno-canto.org/439335
Picoplano pechiamarillo: Andrew Spencer, XC146800. Accesible en www.xeno-canto.org/146800.
Vencejo acollarado: Bernabe Lopez-Lanus, XC48782. Accesible en www.xeno-canto.org/48782

Ermitaño ventripálido: Oscar Humberto Marín Gómez, XC245308. Accesible en www.xeno-canto.org/245308.
Bienteveo chico /bichofué: Jayrson Araujo De Oliveira, XC493178. Accesible en www.xeno-canto.org/493178
Playero manchado alzacolita: Paul Marvin, XC232641. Accesible en www.xeno-canto.org/232641.
Titirijí común / Mosquerito Espatulilla común: Brice de la Croix, XC450795. Accesible en www.xeno-canto.org/450795.
Golondrina gorgirrufa / Barranquera: Jerome Fischer, XC288145. Accesible en www.xeno-canto.org/288145.
Cucarachero común: Thomas G. Graves, XC558722. Accesible en www.xeno-canto.org/558722.
Eufonia piquigruesa: Jerome Fischer, XC557250. Accesible en www.xeno-canto.org/557250.
Zorzal Sabiá /Mirla buchiblanca: Marcelo Jordani Feliti, XC438745. Accesible en www.xeno-canto.org/438745
Pitirre americano/ Tirana dorso negro: Russ Wigh, XC177974. Accesible en www.xeno-canto.org/177974.
Zanate caribeño: Paul Marvin, XC163159. Accesible en www.xeno-canto.org/163159.
Cotara chiricote/ Chilacoa colinegro: Jayrson Araujo De Oliveira, XC447231. Accesible en www.xeno-canto.org/447231.
Tángara azulada/ azulejo común: Yair Guillermo Molina Martínez., XC521293. Accesible en www.xeno-canto.org/521293.
Espiguero pico de plata : Jerome Fischer, XC557239. Accesible en www.xeno-canto.org/557239.
Piojito pardo: Jerome Fischer, XC335741. Accesible en www.xeno-canto.org/335741.
Jacana común: Jayrson Araujo De Oliveira, XC415438. Accesible en www.xeno-canto.org/415438
Cenzontle tropical: Manuel Grosselet, XC423223. Accesible en www.xeno-canto.org/423223.
Momoto rojizo / Barranquero: Jerome Fischer, XC544556. Accesible en www.xeno-canto.org/544556.
Chipe de agua sureño: Scott Gravette, XC469347. Accesible en www.xeno-canto.org/469347.
Tirano melancólico: Joserley Carlos, XC562011. Accesible en www.xeno-canto.org/562011.
Martín pescador: Peter Boesman, XC274523. Accesible en www.xeno-canto.org/274523.
Trogón enligado: Nathan Pieplow, XC5204. Accesible en www.xeno-canto.org/5204.
Turpial toche: Diana Carolina Macana, XC468734. Accesible en www.xeno-canto.org/468734.
Cucarachero currucuchú: Ross Gallardy, XC353887. Accesible en www.xeno-canto.org/353887
Mosquerito silbón: Jayrson Araujo De Oliveira, XC493621. Accesible en www.xeno-canto.org/493621.
Arrendajo: Jayrson Araujo De Oliveira, XC428434. Accesible en www.xeno-canto.org/428434.
Garrapatero mayor: Jeremy Minns, XC341239. Accesible en www.xeno-canto.org/341239.
Turpial cabecirrojo: Jerome Fischer, XC566081. Accesible en www.xeno-canto.org/566081.
Sangre de toro encendido: Kent Livezey, XC368718. Accesible en www.xeno-canto.org/368718.
Turpial de agua: Andrew Spencer, XC22272. Accesible en www.xeno-canto.org/22272

1.

2.

3. 

4.

5.

6.

7.

8. 

9.

10.

11.


12.

13.

14.

15.

16.

17.


18.


19.

20.

21.

22.


23.

24.

25.

26.

27.

28.

29.


30.


31.

32.


33.

34.



35.

36.



37.



38.

39.

40.